

**Producator:** Syngenta Limited, Anglia.

**Furnizor:** Syngenta Agro AG.


## Actellic 50 EC

**Concentrat emulsionabil**

**Insecticid**

**Contine: 500 g/l metil pirimifos.**

**Omologat** in România cu autorizatia nr.403/3.7.1975.



### **OTRAVA - IRTANT**

Grupa IV de toxicitate (toxicitate redusa)

Foarte toxic pentru organisme acvatice si albine.

### **INFLAMABIL:**

Punct de inflamabilitate: 48°C.

In caz de urgenta contactati: Syngenta Agro SRL, Bucuresti,  
tel 40 21 231 95 77 sau Syngenta Alarm Centre Huddersfield, Anglia  
tel. + 44 1484 538 444, fax: + 44 1484 433 197

**Proprietati fizico-chimice:** Actellic 50 EC este un concentrat emulsionabil, organo-fosforic, ce contine 500 g/l metil pirimifos, se prezinta sub forma de lichid de culoare cafenie cu, miros specific. Nu este coroziv.

**Timp de pauza:** 28 zile pentru grâu, 21 zile pentru celelalte culturi.

**Mod de actiune:** Produsul este un insecticid deosebit de eficient, cu o puternica actiune de contact, de ingestie, fumiganta, atât in culturi, cât si in depozite.

**Mod de folosire:** Actellic 50 EC se aplica prin stropiri, la avertizare. Se umple pe jumătate rezervorul masinii de stropit cu apa curata. Se adauga cantitatea necesara de Actellic 50 EC si se completeaza cu apa, agitându-se continuu până la umplere.

Pe timpul aplicarii se va asigura agitarea permanenta a solutiei.

In România, produsul este omologat pentru combaterea urmatoarelor daunatori din culturi si depozite (tabelul urmator).

<b>Cultura</b>	<b>Daunatori</b>	<b>Doza/Conc.</b>
Grâu	Eurygaster spp	1 l/ha
	Haplothrips tritici	2,4 l/ha
Lucerna	Contarinia medicaginis Bruchophagus roddi	1,0 l/ha
Varza	Brevicoryne brassicae	0,05%
Tomate	Macrosiphum solani	0,1%
Legume sera	Tetranychus urticae	0,15%
	Trialeurodes vaporariorum	0,1%
Pomi fructiferi	Quadraspidiotus perniciosus	0,2%

Mar	Cydia pomonella	0,05%
Prun	Cydia funebrana	0,05%
Cires	Rhagoletis cerasi Tetranychus urticae (e.s.)	0,05%
Vita de vie	Lobesia botrana	0,1%
Spatii de depozitare	Daunatori de depozite	1% (50-100 ml/m.p.)
Cereale depozitate (pentru consum)		10 ml p.c./t cereale (diluat in 1 l apa)

**Compatibilitate:** Produsul este compatibil cu majoritatea pesticidelor folosite in mod curent in agricultura. Pentru o folosire corecta, consultati tabelele de compatibilitati.

**Masuri de protectie a mediului:**

Deoarece produsul este foarte toxic fata de albine si organismele acvatice in tehnologiile si instructiunile de utilizare vor fi precizate toate masurile obligatorii de respectat pentru protectia albinelor si a apelor in conformitate cu prevederile legale. Produsul nu se aplica in timpul infloritului. Nu se vor contamina apele curgatoare sau statatoare.

Produsul nu se va utiliza la culturile, in zonele si perioadele in care speciile de Trichogramma pot fi periclitate

**Masuri de igiena si protectie a muncii:** Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii si cu pielea. In timpul lucrului se poarta obligatoriu echipament de protectie, nu se bea, nu se mananca si nu se fumeaza. Dupa terminarea lucrului se spala bine mainile si fata cu multa apa si sapun.

A nu se lasa produsul la indemana copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alapteaza, batrinilor etc. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semintele sau ambalajele acestora.

A nu se imprastia produsul in apropierea surselor de apa sau pe alte culturi decat pe cea recomandata. Ambalajul nu se refoloseste in alte scopuri.

**Masuri de prim ajutor:** In caz de stropire in ochi se tin pleoapele departate si se spala ochii cu un jet usor de apa pe durata a 10-15 minute. Apoi se consulta un medic. In caz de intoxicare prin ingestie, cutanat sau inhalare, se iau urmatoarele masuri: scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant; scoaterea imbracamintei contaminate; spalarea tegumentelor cu multa apa sau cu solutii alcaline, daca sunt la indemana; transportarea urgenta a accidentatului la cea mai apropiata unitate sanitara In caz de intoxicare prin ingestie: Nu provocati voma. Duceti imediat persoana la medic, impreuna cu aceasta eticheta. Tratament medical: Efectuati spalaturi gastrice având grija sa se evite aspirarea continutului gastric. Apoi aplicati tratament simptomatic. Nu se foloseste lapte ca antidot

**Antidot:** Atropina, PAM, Toxogonin, sub supraveghere medicala.

**Masuri de prevenire si stingerea incendiilor:** Se folosesc tehnicile standard pentru stingerea incendiilor.

**Conditii de depozitare si transport:** produsul se depoziteaza in ambalajele originale, in incaperi uscate, racoroase, destinate in exclusivitate pesticidelor. Pe timpul manipularii, transportului si depozitarii se iau obligatoriu toate masurile de protectie a muncii si p.s.i.

**Termen de garantie:** 2 ani de la data fabricatiei, in conditiile de depozitare mentionate mai sus.

**Producator:** Syngenta Limited, Anglia.

**Furnizor:** Syngenta Agro AG.

® marca inregistrata a unei companii din grupul Syngenta

Lot nr.

Data fabricatiei:

**Nota:** Orice nerespectare a indicatiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacitatii sau la esec total.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Institutul si Statiunile de cercetare pe profil din zona si de la Centrele teritoriale de Protectia Plantelor sau Syngenta Agro SRL, Bucuresti, tel: 40 21-231 94 99